

Efterstær

Indledning

Ved en grå stær operation efterlades en tynd membran linsesækken/kapslen, som man placerer den nye kunstige linse i. Denne membran kan i ca. 10% af tilfældene blive uklar i løbet af de kommende måneder til år. Hvis uklarhederne bliver af et sådant omfang, at de påvirker synet, kan man vælge at fjerne dem ved hjælp af laser-stråler. Dette er et smertefrit og kortvarigt indgreb, som ikke kræver andet end lokal dråbe bedøvelse.

Før behandlingen

Forundersøgelse kan udføres umiddelbart før behandlingen, som ikke kræver nogen særlige foranstaltninger. Der dryppes evt. med pupiludvidende dråber ½ time før.

Bedøvelse

Der er ikke behov for bedøvelse.

Behandlingen

Behandlingen er smertefri og tager ca 10 min. Laserstrålen fokuseres på efterstæren, og der "skydes" hul i membranen med en række skud.

Efter behandlingen

De kan tage hjem umiddelbart efter indgrebet. Der er ikke behov for efterbehandling. De kan være generet af lyset, HUSK derfor solbriller. Der kan være lidt fluer for øjet i et par uger.

Transport

De må ikke selv køre bil samme dag.

Senfølger og eventuelle komplikationer

Der kan en sjælden gang opstå nethindeløsning i efterforløbet, men risikoen anses ikke for større end ved den primære grå stær operation.

Øjenlæge, skelekirurg, Overlæge, PhD,
Europæisk certificeret speciallæge i øjensygdomme (FEBO)
Helena Buch Hesgaard
Jægersborgvej 66 A, 2
2800 Lyngby
Tlf: 3964 1066 ved akut behov Tlf: 6177 7793