

Patienter, vi ikke opererer i fuld anæstesi, men som kan opereres i lokalbedøvelse

Vi gør opmærksom på, at det altid er kirurgen og anæstesilægen der bestemmer hvem der forsvarligt kan opereres og bedøves i vores regi. Der kan være yderligere sygdomme vi ikke har listet her der ikke egner sig til operation. Er du i tvivl om vi kan tilbyde dig operation, er du altid velkommen til at ringe til os før du booker din forundersøgelse.

Vi kan ikke tilbyde operation i fuld anæstesi, hvis en eller flere af følgende punkter passer på dig:

- **Asa 3** eller over
- **Alder** : **under 10 år**. Ingen øvre aldersgrænse men pt over 65 år anbefales lokalbedøvelse
- **Anæmi** vi opererer ikke med HB mindre end 6,8 Mmol/l.
- **Anæstesi** Kendt med tidligere alvorlige komplikationer til anæstesi
- **Biologiske lægemidler** Hvis pt ikke kan pausere efter aftale med rheumatolog
- **Blødningsforstyrrelse** Unormal
- **BMI** over 30
- **Epilepsi** pt Med nylige anfald
- **Hjerte- kar lidelser** Tidl. Tromboemboliske sygdomme, herindunder livslang AK behandling Apoplexia cerebri, Ustabil angina pectoris, AMI, Hjertesvigt, Hjerteklapsygdom Alle nævnte er ASA 3 og kan ikke opereres her.
- **Hypertension** Ubehandlet eller dårligt kontrolleret blodtryk >140/90 skal henvises til egen læge før videre kontrol og evt. behandling
Efter startet behandling skal pt vente 4-6 uger med planlagt operation
- **Malign Hypertermi**
- **Klorhexidin** Allergi
- **Kol**
- **Latex** Allergi
- **Lever funktion nedsat**
- **Luftvej** Potentielt eller kendt vanskelig luftvej
- **Lungefunktion forringet** Relevante undersøgelser af lungefunktion ex spirometri FEV, SpO2 til vurdering
- **Medicin** Patienter der er under udredning eller ikke er velregulerede
- **MRSA eller andre infektioner**
- **Nyrer funktion nedsat**
- **Psykiatriske patienter** Mildere velbehandlede psykiske lidelser kan vurderes
- **Søvnapnø** svær
- **Stofmisbruger**
- **Organ transplanterede patienter**
- **Type 1 diabetes**
- **Type 2 diabetes** Hvis dårligt reguleret
- **Vægttabsmedicin** Wegovy eller lign Pt skal pausere 3 uger inden operationen
- **Pt i antitrombotisk beh** Hvis pt ikke kan pausere AK beh tilbyder vi ikke operation. Pausering aftales med egen læge eller kontrollerende sygehusafd. Magnyl pauseres i 3 dage, Clopidogrel i 5 dage.

Listen er ikke endelig, og vi forbeholder os ret til at afvise patienter, der vurderes fysisk, psykisk eller socialt uegnet til operation. Vi har valgt at lave ovenstående frasortering for at mindske risikoen for komplikationer ved operationer i fuld narkose. Skeleoperationen kan i stedet laves i lokalbedøvelse. Børn under 10 år opereres ikke i klinikken.